

INFORMATIE VOOR PATIËNTEN



Appendectomie

Algemene heelkunde



Az Damiaan
Dicht bij het leven



Aarzel niet om contact op te nemen met ons.
Wij helpen je graag verder.

secretariaat Algemene heekunde: 059 41 42 21


www.azdamiaan.be/nl/zorgaanbod/algemene-heelkunde
algemeneheelkunde@azdamiaan.be

© Az Damiaan vzw, april 2021. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.

Az Damiaan heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met jouw zorgverlener. Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn Az Damiaan, de artsen en medewerkers hiervoor niet aansprakelijk.

Algemene informatie

Appendicitis of blinde darmontsteking is een ontsteking van het blindeindigende stukje darm dat zich op de overgang van dunne darm naar dikke darm bevindt.



De ontsteking ontstaat door een verstopping van de binnenkant van de appendix, hetzij door verdikking van het slijmvlies, hetzij door etensresten of stoelgang en zeldzaam door parasieten of tumor. Appendicitis kan op alle leeftijden voorkomen, maar komt het meest voor tussen de leeftijd van 10 en 17 jaar (2.5 per 1000), meer bij jongens dan bij meisjes.


Het natuurlijke verloop bestaat uit beginnende ontsteking, meestal aan de tip, evoluerend naar verdere ontsteking met begeleidende buikvliesontsteking en perforatie ('gesprongen appendix') over een gemiddeld verloop van 72u. Symptomen bestaan uit buikpijn (meestal rechts onder in de buik), koorts, verminderde eetlust en braken.

De behandeling van appendicitis bestaat dan ook meestal uit het (snel) wegnemen van de appendix. In bijna alle gevallen kan dit met een kijkoperatie gebeuren, waarbij 3 kleine openingen (kleiner dan 1cm) worden gemaakt in de buik. In zeldzame gevallen beslist de chirurg om de ontsteking eerst met antibiotica onder controle te houden en achteraf de ingreep uit te voeren.

Het verloop na de ingreep is afhankelijk van de graad van ontsteking. Bij de meeste eenvoudige ontstekingen, hoeven er geen verdere antibiotica toegediend te worden en kan de patiënt de volgende dag naar huis. Bij een uitgebreide ontsteking, dienen er wel antibiotica toegediend te worden en kan het nodig zijn om een wondrain te plaatsen voor enkele dagen. Het verblijf kan dan enkele dagen tot een week langer zijn.

Bij chronische problemen met de appendix, wordt deze soms preventief verwijderd in dagziekenhuis.

VOLG ONS OP:

 / [azdamiaan](#)

 / [azdamiaan](#)

 / [company/azdamiaan](#)

 / [az-damiaan](#)

 / [@azdamiaan](#)



Az Damiaan
Dicht bij het leven

Az Damiaan vzw
Gouwelozestraat 100
8400 Oostende
Tel. +32 (0)59 41 40 40

info@azdamiaan.be
www.azdamiaan.be