

Ontslagtips na coronarografie via pols

Informatie voor patiënten



Beste patiënt

Na het onderzoek mag u, tenzij anders gezegd, eten en drinken.

U moet voldoende drinken om de contrastvloeistof sneller uit uw lichaam te verwijderen via de nieren. Doe dit echter nooit zonder toelating van de arts of de verpleegkundige!

De verpleegkundige inspecteert regelmatig de punctieplaats op bloedingen, roodheid, zwelling en pijn, alsook uw bloeddruk, pols en algemeen welzijn.

Bij een polsprocedure heeft u geen verplichte bedrust en mag u met de hulp van een verpleegkundige opstaan.

Het is belangrijk om de eerste 24 uur na het onderzoek uw pols weinig te gebruiken, niet te heffen en geen zware fysieke arbeid te leveren.

Risico's

Ernstige complicaties zijn uiterst zeldzaam.

Het is belangrijk om de richtlijnen van de arts en de verpleegkundige nauwgezet op te volgen.

Een beperkte nabloeding met lokale zwelling en een blauwe verkleuring ter hoogte van de aanprikplaats is mogelijk. Dit is niet verontrustend. Het kan enkele dagen duren voor de bloeditstorting verdwenen is.

U neemt best contact op met uw cardioloog of huisarts of met de dienst spoedgevallen (059 41 40 81)

- bij bloeding, blijvende pijngevoeligheid of zwelling aan de pols
- bij koorts
- bij wit worden of koud aanvoelen van de hand.