

# Gastroscopie



Informatiebrochure voor de opgenomen patiënt


PATIENTENETIKET

Geachte mevrouw

Geachte heer

In deze brochure vindt u meer informatie over de voorbereiding en het verloop van een maagonderzoek (= gastroscopie).

Dit onderzoek is noodzakelijk om afwijkingen van de maag, slokdarm en de twaalfvingerige darm (= duodenum) op te sporen. Hiervoor wordt een endoscoop gebruikt. Dit is een flexibele slang voorzien van een kleine camera die ingebracht wordt via de mond tot in de slokdarm en de maag. Dit toestel wordt niet in de luchtwegen ingebracht, u kan dus normaal ademen. Het onderzoek gaat door op de endoscopie-afdeling.



## De voorbereiding

---

De maag moet leeg zijn tijdens het onderzoek, daarom is het van groot belang dat u nuchter bent. Voedselresten kunnen het zicht beperken en kunnen aanleiding geven tot braken.

**Dit onderzoek wordt in principe zonder verdoving uitgevoerd. Indien u verkiest toch slaperig gemaakt te worden of lichtjes algemeen verdoofd te worden kan u dit bespreken met uw behandelende arts.**

### **Gastroscopie zonder sedatie**

U mag zes uur vóór het onderzoek geen vast voedsel meer innemen. Een beperkte inname van heldere vloeistoffen zoals water en thee mag tot één uur vóór het onderzoek. Bij vertrek naar het onderzoek dient een eventuele gebitsprothese uitgenomen te worden. Gelieve ook te vermelden als u loszittende tanden hebt.

### **Gastroscopie onder sedatie**

U mag zes uur vóór het onderzoek geen vast voedsel meer nemen. Een beperkte inname van heldere vloeistoffen zoals water en thee mag tot één uur vóór het onderzoek. De verpleegkundige van de verpleegafdeling zal een infuus plaatsen. Bij vertrek naar het onderzoek dient een eventuele gebitsprothese uitgenomen te worden. Gelieve ook te vermelden als u loszittende tanden hebt.

### **Gastroscopie onder lichte verdoving via anesthesist**

U mag zes uur vóór het onderzoek geen vast voedsel meer nemen. Een beperkte inname van heldere vloeistoffen zoals water en thee mag tot twee uur vóór het onderzoek. De verpleegkundige van de verpleegafdeling zal een infuus plaatsen. Bij vertrek naar het onderzoek dient een eventuele gebitsprothese uitgenomen te worden. Gelieve ook te vermelden als u loszittende tanden hebt.

## Wat met uw thuismedicatie

---

Stel uw arts volledig op de hoogte over uw medische voorgeschiedenis en medicatiegebruik. Uw medicatie zal eventueel zo nodig aangepast worden in functie van het onderzoek.



## Hoe verloopt het onderzoek?

---

### **Gastroscoopie zonder sedatie**

U neemt plaats op uw linkerzijde. Met een spray die Xylocaine® bevat wordt de keel verdoofd. De verpleegkundige zal een mondstuk plaatsen tussen de tanden om uw gebit en de gastroscoop te beschermen. Als de gastroscoop in de mond ingebracht wordt, kan dit even ongemakkelijk aanvoelen. Het is belangrijk dat u rustig blijft ademen en dat u de tips van de verpleegkundige opvolgt.

Na het onderzoek gaat u onmiddellijk terug naar de kamer. U blijft nog één uur nuchter, dit omdat uw keel lokaal verdoofd werd met een keelspray. Indien u nog andere onderzoeken moet ondergaan of op verder advies van de arts kan het zijn dat u nog wat langer nuchter hoeft te blijven. Dit wordt door de verpleegkundige meegedeeld zodra het onderzoek voorbij is.

### **Gastroscoopie onder sedatie**

U neemt plaats op uw linkerzijde. Met een spray die Xylocaine® bevat wordt de keel verdoofd. De verpleegkundige zal een mondstuk plaatsen tussen de tanden om uw gebit en de gastroscoop te beschermen. De sederende medicatie wordt bij de start van het onderzoek via het infuus toegediend, hierdoor gaat u even slaperig gemaakt worden.

Na het onderzoek gaat u direct terug naar de kamer. In de meeste gevallen zal u zich niets meer van het onderzoek herinneren, men noemt dit amnesie. U blijft nog één uur nuchter, dit omdat uw keel lokaal verdoofd werd met een keelspray. Indien u nog andere onderzoeken moet ondergaan of op verder advies van de arts kan het zijn dat u nog wat langer nuchter hoeft te blijven. Dit wordt door de verpleegkundige meegedeeld zodra het onderzoek voorbij is.

### **Gastroscoopie onder lichte verdoving via anesthesist**

U neemt plaats op uw linkerzijde. De verpleegkundige zal een mondstuk plaatsen tussen de tanden om uw gebit en de gastroscoop te beschermen. De verdoving wordt bij de start van het onderzoek door de anesthesist via het infuus toegediend. U wordt kortstondig verdoofd.

Na het onderzoek wordt u even kort gevolgd op de ontwakingsafdeling die gelegen is aan de endoscopieruimte en daarna wordt u terug naar uw kamer gebracht. In de meeste gevallen zal u zich niets meer van het onderzoek herinneren, men noemt dit amnesie. U blijft nog twee uur nuchter, dit in kader van de verdoving. Indien u nog andere onderzoeken moet ondergaan of op verder advies van de arts kan het zijn dat u nog wat langer nuchter hoeft te blijven. Dit wordt door de verpleegkundige meegedeeld zodra het onderzoek voorbij is.

## Na het onderzoek

---

Na het onderzoek (dat maximum vijf minuten duurt) kan u een irritatiegevoel ter hoogte van de keel hebben en kan u een opgeblazen gevoel hebben door de lucht die tijdens het onderzoek werd ingeblazen. Dit is volkomen normaal en gaat snel voorbij.

## Wenst u verdere informatie

---

U kunt bij alle verpleegkundigen op de afdeling terecht voor verdere inlichtingen.

© Az Damiaan vzw, maart 2018. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

Az Damiaan vzw  
Gouweloestraat 100  
8400 Oostende  
Tel. +32 (0)59 41 40 40

Fax +32 (0)59 41 40 20  
[info@azdamiaan.be](mailto:info@azdamiaan.be)  
[www.azdamiaan.be](http://www.azdamiaan.be)