

# Schildkliertherapie

Informatiebrochure voor patiënten



Beste patiënt

U kreeg een behandeling met een radioactieve stof (Iodium 131) wegens hyperthyroidie (dit is een teveel werken van de schildklier).

Dergelijke behandeling wordt reeds lang over de ganse wereld toegepast en heeft zijn nut, eenvoud en doeltreffendheid bewezen dankzij vele studies die werden verricht.

Tevens werden geen bewijsbare schadelijke gevolgen genoteerd (noch voor u, noch voor uw naaste leefgenoten) indien de behandeling correct wordt toegepast.



Om de stralingsdosis voor uw omgeving toch zo laag mogelijk te houden, raden wij aan de volgende regels in acht te nemen (gedurende 3 à 4 dagen, vanaf het moment dat u de Iodiumtablet hebt ingenomen):

- Vermijd langdurig contact met anderen op korte afstand (< 1 meter).
- Vermijd contact met zwangere vrouwen en zeer jonge kinderen.
- Slaap apart voor enkele nachten indien mogelijk en vermijd seksuele relaties tijdens deze periode.
- Vermijd zwangerschap voor 6 à 12 maanden via betrouwbare anticonceptie.
- Vrouwen dienen de borstvoeding te onderbreken voor de behandeling met radioactief Iodium.
- Was de handen zorgvuldig na gebruik van het toilet. Tweemaal doorspoelen na elk gebruik.
- Gebruik apart eetgerief.




## Contact

---

Dr. Eduard D'Hondt

Nucleaire geneeskunde

 059 41 60 70

© Az Damiaan vzw, augustus 2015. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

Az Damiaan vzw  
Gouweloestraat 100  
8400 Oostende  
Tel. +32 (0)59 41 40 40

Fax +32 (0)59 41 40 20  
[info@azdamiaan.be](mailto:info@azdamiaan.be)  
[www.azdamiaan.be](http://www.azdamiaan.be)